

Hypoesthésie - Stade I de lésions axonales Aβ

Séance 2	4	6	8	...								
Seuil de Perception à la Pression (SPP)	Déterminer la pression minimale que le patient peut détecter										p.89	
	Recherche de la référence											
	5.88	<input type="checkbox"/>										
	5.07	<input type="checkbox"/>				Choix des 7 esthésiomètres						
	4.56	<input type="checkbox"/>		5.88	5.46	5.18	5.07	4.93				
	4.08	<input type="checkbox"/>		75	29	15	11,7	8,7				
	3.22	<input type="checkbox"/>		4.74	4.56	4.31	4.17	4.08				
				5,5	3,6	2,1	1,5	1,2				
				3.84	3.61	3.22	2.83	2.44				
				0,7	0,4	0,2	0,1	0,03				
	6 séries Ascendantes/Descendantes											
	A	1er perçu							g	moyenne des 6 séries		
D	dernier perçu							g				
A	1er perçu							g				
D	dernier perçu							g				
A	1er perçu							g				
D	dernier perçu							g				
Séance 3	5	7	9	...								
Test de discrimination de 2 points statiques	Mesurer l'importance de l'hypoesthésie										p.67	
	rechercher la plus petite distance entre 2 points détectée.											
	105		90		77		66		56		48	
	41		35		30		25		21		18	
	15		12		10		8		6		5	
	4		3		2							
	début du test au moment où le patient hésite										mm	
	<input type="checkbox"/>	2 pts	<input type="checkbox"/>	1 pt	<input type="checkbox"/>	2 pts	<input type="checkbox"/>	2 pts	<input type="checkbox"/>	1 pt		
<input type="checkbox"/>	1 pt	<input type="checkbox"/>	1 pt	<input type="checkbox"/>	2 pts	<input type="checkbox"/>	2 pts	<input type="checkbox"/>	1 pt			
7/10 ok « 2 points statiques à										mm »	normes en Annexe V	
Seuil de perception à la vibration (SPV)											p.108	
	Déterminer la vibration d'amplitude minimale que le patient peut percevoir											
	Vibralgic 8 % (40%)				D						2 sec toutes les 8 sec	
Vibradol 0,20 mm (1 mm)				A						au centre de l'esthésiographie		
				D								
Plan de rééducation – STOP au « 2 points » normalisé												
Programme de rééducation des tracés (p. 102) dès ébauche de S2	Thérapie du touche à tout (p. 104) 4x5 minutes par jour ou moins longtemps	Sensibilité à la vibration (p. 107) SPV normal STOP 5 min à chaque séance SPV + 4% ou 0,1 mm	Éval continue - SPP - 2 points statiques - SPV	Rééducation des aspérités (p. 103)								